

Informace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobou – Mateřská škola Těchonín

Váš syn/dcera byl/a ve styku s osobou covid pozitivní, proto je mu nařízena karanténa po dobu **10ti dnů** ode dne posledního kontaktu – **27.11.2020** s pozitivně testovanou osobou,

tj. do 7.12.2020 včetně.

Osobám, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, bude proveden v rozmezí **5. – 7. dne od posledního kontaktu (27.11.2020) s pozitivně testovanou osobou, nejpozději do 10. dne**, RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Testovat se tedy lze již **od středy 2.12.2020 do 7.12.2020**. Po obdržení negativního výsledku testu z laboratoře a ukončení karanténního opatření, které je v délce trvání 10 ti dnů, může dítě opět nastoupit do školského zařízení, pokud nemá žádné klinické příznaky. O nařízení karantény informujte praktického lékaře pro děti a dorost. Dětského lékaře kontaktujte též v případě výskytu klinických příznaků/potíží.

Tímto vyhláší Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, prostřednictvím ředitelky Základní školy a Mateřské školy Těchonín, Rozhodnutí o karanténě.

Elektronická žádanka na RT - PCR test bude vystavena na vyžádání pracovníky Krajské hygienické stanice. Zákonní zástupci dětí se dostaví s dětmi do **jakékoliv laboratoře**, která provádí vyšetření na Covid 19, **rodiče si sami rezervují termín ve vybraném odběrovém místě** (přes webové stránky – Nemocnice Pardubického kraje – Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Chrudim, Pardubice; Fakultní nemocnice Hradec Králové aj.), kde bude při testu předložena kartička pojišťovny dítěte a sděleno jejich rodné číslo. **Laboratoř si žádanku vygeneruje sama ze systému již zadaných žádanek.**

V době karantény je nutné:

1) zdržovat se pouze v místě bydliště a omezit styk s ostatními osobami,

2) sledovat svůj zdravotní stav, průběžně si měřit tělesnou teplotu (2x denně – ráno a večer), a při objevení se některého z klinických příznaků - zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest, svalů, bolest kloubů – oznámit tuto skutečnost neprodleně distanční formou (tj. telefonicky / e-mailem), svému praktickému lékaři a řídit se jeho pokyny;

3) po dobu karantény

a) vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo – zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70 % alkoholu, nebo dezinfekční prostředek s plně virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku, používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami,

b) provádět průběžně ohniskovou ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.

Bezodkladnost výše uvedených opatření je důležitá z důvodu možného ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel infekčním onemocněním, neboť při nerespektování opatření by se osoba podezřelá z nákazy mohla stát zdrojem nákazy a mohla by sama infekční onemocnění dále šířit.